

1. Bezeichnung des Arzneimittels

Narben Gel
Gel

2. Qualitative und quantitative Zusammensetzung

| | |
|---|--------|
| 10 g enthalten: | |
| Wirkstoffe: | |
| Allium cepa ferm 34a Ø | 0,1 g |
| Barium citricum Dil. D10 aquos. (HAB, Vs. 8b) | 0,1 g |
| Cutis feti bovis GI Dil. D4 (HAB, Vs. 41b) | 0,1 g |
| Hirudo medicinalis ex animale toto GI Ø (HAB, Vs. 41c) | 0,1 g |
| Mesenchym bovis GI Dil. D4 (HAB, Vs. 41b) | 0,1 g |
| Polygonatum odoratum e radice ferm 33d Dil. D2 (HAB, Vs. 33d) | 0,1 g |
| Rosmarini aetheroleum | 0,05 g |
| Thuja occidentalis e summittatibus ferm 33e Dil. D6 (HAB, Vs. 33e) | 0,1 g |
| Vespa crabro ex animale toto GI Dil. D3 (HAB, Vs. 41c) | 0,1 g |
| (Die Wirkstoffe 2, 3, 5, 6 und 8 werden über die letzte Stufe gemeinsam potenziert.) | |

Die Liste aller sonstigen Bestandteile siehe
unter 6.1.

3. Darreichungsform

Gel

4. Klinische Angaben

4.1 Anwendungsbereiche

gemäß der anthroposophischen Menschen-
und Naturerkenntnis.

Dazu gehören:

Anregung der strukturierenden Aufbaukräfte
bei Narben-, Granulom- (knötchenartige Ver-
änderung) und Keloidbildungen der Haut.

4.2 Dosierung, Art und Dauer der Anwendung

Die Behandlung mit Narben Gel sollte nach
vollständiger Wundheilung beginnen.

Das bedeutet:

- wenn das Wundgebiet reizfrei und ohne Schorf ist
- bei genähten Wunden, wenn nach dem Ziehen der Fäden kein Wundsekret mehr aus den Stichkanälen abgesondert wird

Soweit nicht anders verordnet, gilt für Säuglinge, Kinder und Erwachsene: Gel 1- bis 2-mal täglich auftragen und bis zur Trocknung einreiben oder als Salbenverband anwenden.

Durch Antrocknen des Narben Gels bildet sich eine dünne Schicht, die sich nach und nach wieder ablöst.

Die Behandlung der Erkrankung sollte nach 2 Wochen abgeschlossen sein. Tritt innerhalb dieser Zeit keine Besserung ein, ist ein Arzt aufzusuchen.

Die Dauer der Behandlung von chronischen Krankheiten erfordert eine Absprache mit dem Arzt.

4.3 Gegenanzeigen

Das Arzneimittel darf nicht angewendet werden bei bekannter Überempfindlichkeit ge-

gen einen der Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile.

4.4 Besondere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

Narben Gel sollte nicht im Bereich von offenen Wunden angewendet werden.

Bei länger anhaltenden oder unklaren Beschwerden muss ein Arzt aufgesucht werden.

Dieses Arzneimittel enthält sonstige Bestandteile mit Linalool und α -Terpinen, welche allergische Reaktionen hervorrufen können.

4.5 Wechselwirkungen mit anderen Mitteln und sonstige Wechselwirkungen

Hinweise zu Wechselwirkungen mit Narben Gel oder einem der Bestandteile sind nicht bekannt.

4.6 Schwangerschaft und Stillzeit

Langjährige Erfahrung mit Narben Gel lassen nicht auf Nebenwirkungen in der Schwangerschaft oder auf die Gesundheit des Fetus/Neugeborenen schließen. Bisher sind keine einschlägigen epidemiologischen Daten verfügbar.

Es liegen keine hinreichenden tierexperimentellen Studien in Bezug auf die Reproduktionstoxizität der Bestandteile von Narben Gel vor.

Wie alle Arzneimittel sollte Narben Gel in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt oder Apotheker angewendet werden.

4.7 Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Nicht zutreffend.

4.8 Nebenwirkungen

Bei Anwendung dieses Arzneimittels kann es zu folgenden Nebenwirkungen kommen: Überempfindlichkeitsreaktionen und Hautreizzungen wie Ausschläge, Brennen, Hautrötungen, Juckreiz oder Nesselsucht. Das Arzneimittel ist dann abzusetzen und ein Arzt aufzusuchen.

Meldung des Verdachts auf Nebenwirkungen

Die Meldung des Verdachts auf Nebenwirkungen nach der Zulassung ist von großer Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung des Nutzen-Risiko-Verhältnisses des Arzneimittels. Angehörige von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung dem

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte
Abt. Pharmakovigilanz
Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3
D-53175 Bonn
Website: www.bfarm.de
anzuzeigen.

4.9 Überdosierung

Intoxikationen durch eine Überdosierung sind bisher nicht bekannt geworden. Bei Auftreten von Überdosierungserscheinungen ist eine symptomatische Therapie erforderlich.

5. Pharmakologische Eigenschaften

5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: Anthro-
posophisches Arzneimittel bei Erkrankun-
gen der Haut

Therapeutisches Ziel

Zurückdrängung von pathologischen Wu-
cherungs- und Verhärtungstendenzen und
Anregung eines strukturierten Neuaufbaus
in der Haut.

Barium citricum begegnet einer zu star-
ken Verhärtung und Auskühlung im Physi-
schen durch die Ich-Organisation.

Cutis (feti) und **Mesenchym** aktivieren über
die Lebensorganisation die regenerativen
und plastischen Kräfte von Oberhaut (**Cutis**)
und Unterhautbindegewebe (**Mesenchym**).

Hirudo und **Vespa crabro** wirken beide
von der Lebensorganisation aus verflüssi-
gend und auflösend bei überstarker Fibro-
sierung, wobei Hirudo mehr bei Narben-
wucherung, Vespa crabro mehr bei Narben-
verhärtung hilft.

Allium cepa regt die Empfindungsorgani-
sation an und übt dadurch eine Reizwir-
kung auf die Haut aus.

Thuja drängt pathologische Wucherungs-
tendenzen zurück.

Polygonatum mindert eine zu starke bin-
degeweibige Verhärtung.

Rosmarinöl regt die Wärmeorganisation
und die Durchblutung in der Haut an.

5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Erkenntnisse über die Pharmakokinetik von
Narben Gel liegen nicht vor. Diese sind zu
einer sachgemäßen Anwendung innerhalb
der anthroposophischen Therapierichtung
nicht erforderlich und bei potenzierten Zu-
bereitungen nicht zu ermitteln.

Bioverfügbarkeit

Erkenntnisse über die Bioverfügbarkeit von
Narben Gel liegen nicht vor. Diese sind zu
einer sachgemäßen Anwendung innerhalb
der anthroposophischen Therapierichtung
nicht erforderlich und bei potenzierten Zu-
bereitungen nicht zu ermitteln.

5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Wie in der Fachliteratur beschrieben, kön-
nen die Bestandteile Polygonatum odora-
tum und Thuja occidentalis präklinische
Effekte hervorrufen. Diese sind jedoch für
das vorliegende Arzneimittel nicht zu erwar-
ten, da die enthaltenen Konzentrationen
der Bestandteile weit unter der toxikologi-
schen Grenze liegen.

Narben Gel

6. Pharmazeutische Angaben

6.1 Liste der sonstigen Bestandteile

Glycerol,
Guar,
Natriumalginat,
Natriumchlorid,
Natriumhydrogencarbonat,
wässrige kolloide Siliciumdioxidlösung her-
gestellt mit Citronensäure-Monohydrat,
Thymianöl,
Gereinigtes Wasser.

6.2 Inkompatibilitäten

Nicht zutreffend.

6.3 Dauer der Haltbarkeit

2 Jahre

Nach Anbruch 12 Wochen haltbar.

6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Aufbewahrung

Nicht über 25 °C lagern/aufbewahren!

6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

Aluminiumtube mit 30 g

6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Beseitigung

Keine besonderen Anforderungen.

7. Inhaber der Zulassung

WALA Heilmittel GmbH
73085 Bad Boll/Eckwälden
DEUTSCHLAND
Tel. +49 (0)7164 930-181
Fax +49 (0)7164 930-297
info@wala.de

8. Zulassungsnummer

6507176.00.00

9. Datum der Erteilung der Zulassung/ Verlängerung der Zulassung

16.12.2004

10. Stand der Information

Mai 2025

11. Verkaufsabgrenzung

Apothekenpflichtig

Rote Liste Service GmbH

www.fachinfo.de

Mainzer Landstraße 55
60329 Frankfurt



009028-76130-100