



Produktbeschreibung:

Mucosamin® Vaginalcreme ist ein Medizinprodukt gemäß der Richtlinie 93/42/EWG, das primär dem Schutz der vaginalen Schleimhaut dient. Die Hauptbestandteile Hyaluronsäure und verschiedene Aminosäuren unterstützen die Regeneration der Schleimhaut durch Förderung der Kollagenbildung und des Aufbaus des Bindegewebes. Mucosamin® Vaginalcreme wird für die Behandlung von Schleimhautentzündungen der Vagina und Vulva (Vulvovaginitis) im Zusammenhang mit Chemotherapie, Strahlentherapie im Beckenbereich eingesetzt.

Darreichungsform:

Creme mit Einweg-Applikatoren

Inhaltsstoffe:

Gereinigtes Wasser, Natriumhyaluronat, Glycin, L-Prolin, L-Leucin, L-Lysin HCl, Cetylstearylactanoat, Acrylsäure-Vinylester-Copolymer, Cetylstearylalkohol, Kalium-Cetylphosphat, Imidazolidinylharnstoff, Phenoxyethanol-Paraben, Natriumhydroxid

Indikation:

Mucosamin® Vaginalcreme ist zur Behandlung von Entzündungen der Vaginalschleimhaut (Vulvovaginitis) im Rahmen von Strahlen-/Chemotherapie bei Tumoren im Beckenbereich sowie kombinierten oder begleitenden Behandlungen indiziert. Es wirkt schmerz-, reizlindernd, schützend und unterstützt die Geweberegeneration und den Heilungsprozess der Vaginalschleimhaut.

Klinische Wirkungsweise:

Vulvovaginitis infolge von Strahlen- / Chemotherapie kann als symptomatische Nebenwirkung bei onkologischen Patienten aufgrund reduzierter Zellteilungsrate auftreten. Schwere Schleimhautentzündungen einhergehend mit Erythemen, Ulzera und brennenden Schmerzen können die Lebensqualität beeinträchtigen.

Die wesentlichen Komponenten von Mucosamin® Vaginalcreme – Hyaluronsäure und ausgewählte Aminosäuren – unterstützen die Schleimhautregeneration, sodass Dauer und Schmerzintensität reduziert werden. Als Hauptbestandteil des Bindegewebes ist Hyaluronsäure durch eine ausgeprägte mukoadhärente Eigenschaft und die Fähigkeit zur Bildung eines Schutzfilms charakterisiert. L-Prolin, L-Lysin, L-Leucin und Glycin begünstigen die Kollagensynthese und beschleunigen folglich die Wundheilung.

Dosierung:

Einmal oder mehrmals täglich die Menge eines Applikators je nach Schwere der Symptome und nach ärztlichem Ermessen anwenden.

Anwendungshinweise, Vorsichtsmaßnahmen und Nebenwirkungen:

Vor der lokalen Anwendung den betroffenen Bereich gründlich reinigen. Den Schraubverschluss entfernen und den Applikator auf die Tube schrauben und die Creme aus der Tube in den Applikator saugen, bis dieser

vollständig gefüllt ist. Den Applikator nun vorsichtig einführen und auf den Applikator drücken, damit der gesamte Inhalt aus dem Applikator gelangt. Den betroffenen Bereich gleichmäßig bedecken.

Mucosamin® Vaginalcreme zeichnet sich durch eine allgemein gute Verträglichkeit aus. Es sind keine Nebenwirkungen und Überdosierungserscheinungen bekannt. Sollten dennoch Nebenwirkungen oder lokale Reaktionen und Anzeichen einer Infektion (Schwellung, Erythem, Sekretion, Wärmegefühl oder Schmerzen) auftreten, muss die Behandlung abgebrochen und ein Arzt konsultiert werden. Während der Schwangerschaft und Stillzeit darf die Anwendung nur auf ärztliche Anweisung erfolgen.

Bei Überempfindlichkeit gegen die Inhaltsstoffe, darf Mucosamin® Vaginalcreme nicht angewendet werden.

Der Applikator ist nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Wechselwirkungen mit anderen Behandlungen:

Es sind keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und Medizinprodukten bekannt.

Lagerungshinweise:

Bei 8–30 °C trocken und vor Sonneneinstrahlung / Wärme geschützt lagern. Nicht im Kühlschrank lagern.



Vertreiber:

Burg Pharma GmbH
Wilhelmstraße 8
06406 Bernburg,
Deutschland

Zentrale Anforderung an:

Rote Liste Service GmbH

Fachinfo-Service

Mainzer Landstraße 55

60329 Frankfurt