

**Produktbeschreibung:**

Vulnamin® PWD Pulver ist ein Medizinprodukt gemäß der Richtlinie 93/42/EWG, das primär den Wundheilungsprozess unterstützt. Die Hauptbestandteile Hyaluronsäure und verschiedene Aminosäuren begünstigen die Regeneration der Haut durch Förderung der Kollagenbildung und des Aufbaus des Bindegewebes.

**Darreichungsform:**

Pulver

**Inhaltsstoffe:**

Natriumhyaluronat, Glycin, L-Prolin, L-Leucin, L-Lysin HCl

**Indikation:**

Vulnamin® PWD Pulver ist zur Behandlung von Wunden mit mäßigem oder starkem Exsudat indiziert. Durch Förderung der Bildung von Granulationsgewebe und des Wiederaufbaus des Bindegewebes wird der Heilungsprozess von Hautläsionen und -geschwüren unterstützt.

**Klinische Wirkungsweise:**

Vulnamin® PWD Pulver begünstigt die Bildung von Granulationsgewebe und fördert den Heilungsprozess. Durch die Fähigkeit zur Bildung eines Schutzfilms von Hyaluronsäure kann die Wundheilung der Haut beschleunigt werden. Ferner unterstützen die Aminosäuren L-Prolin, L-Lysin, L-Leucin und Glycin die Kollagensynthese. Vulnamin® PWD Pulver erleichtert das Abstoßen von nekrotischem Gewebe und schützt die Hautintegrität.

**Dosierung:**

2–3 mal wöchentlich die Wundfläche mit einer ausreichenden Menge Vulnamin® PWD Pulver bedecken. Bei besonders großen Wunden können mehrere Einzelpackungen angewendet werden, um die gesamte Wundfläche zu bedecken.

**Anwendungshinweise, Vorsichtsmaßnahmen und Nebenwirkungen:**

Vulnamin® PWD Pulver ist nur zur äußeren Anwendung geeignet. Vor der Wundbehandlung die Hände gründlich waschen. Die Wunde mit Kochsalzlösung spülen und reinigen. Das Pulver auf das Wundbett auftragen. Die Wunde mit einem Schutzverband abdecken.

Trotz der guten Verträglichkeit können in seltenen Fällen lokale Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten, die jedoch spontan wieder abklingen.

Es sind keine Nebenwirkungen und Überdosierungserscheinungen bekannt. Sollten dennoch Nebenwirkungen auftreten, muss die Behandlung abgebrochen und ein Arzt konsultiert werden. Bei gleichzeitiger Behandlung mit Arzneimitteln und/oder bei einer Behandlungsdauer über 6 Wochen sollte ebenfalls ein Arzt konsultiert werden. Während der Schwangerschaft und Stillzeit darf die Anwendung nur auf ärztliche Anweisung erfolgen.

Bei Überempfindlichkeit gegen die Inhaltsstoffe, darf Vulnamin® PWD Pulver nicht angewendet werden. Nicht für Wunden mit Wundschorf geeignet. Nicht bei offensichtlichen Infektionen anwenden.

Nicht angewendetes Pulver ist zu entsorgen.

Für Kinder unzugänglich aufzubewahren.

**Wechselwirkungen mit anderen Behandlungen:**

Es sind keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und Medizinprodukten bekannt.

**Lagerungshinweise:**

Bei 8–30 °C trocken und vor Sonneneinstrahlung / Wärme geschützt lagern. Nicht im Kühlschrank lagern.


**Vertreiber:**

Burg Pharma GmbH  
Wilhelmstraße 8  
06406 Bernburg,  
Deutschland

Zentrale Anforderung an:

Rote Liste Service GmbH

Fachinfo-Service

Mainzer Landstraße 55  
60329 Frankfurt