

**Produktbeschreibung:**

Vulnamin® Salbe ist ein Medizinprodukt gemäß der Richtlinie 93/42/EWG, das primär den Wundheilungsprozess unterstützt. Die Hauptbestandteile Hyaluronsäure und verschiedene Aminosäuren unterstützen die Regeneration der Haut durch Förderung der Kollagenbildung und des Aufbaus des Bindegewebes.

**Darreichungsform:**

Salbe

**Inhaltsstoffe:**

Gereinigtes Wasser, Hyaluronsäure, Glycin, L-Prolin, L-Leucin, L-Lysin HCl, Cetylstearyloctanoat, Acrylsäure-Vinylester-Copolymer, Cetylstearylalkohol, Kalium-Cetylphosphat, Imidazolidinylharnstoff, Phenoxyethanol-Paraben, Natriumhydroxid

**Indikation:**

Vulnamin® Salbe ist zur Behandlung von Wunden mit wenig oder geringem Exsudat (z. B. chronische Geschwüre und Dekubituswunden) indiziert. Es unterstützt der Regeneration der Epithelzellen und den Wiederaufbau des Bindegewebes durch Aufrechterhaltung eines feuchten Mikroklimas.

**Klinische Wirkungsweise:**

Vulnamin® Salbe fördert die Abstoßung von nekrotischem Gewebe und schützt die Hautintegrität. Durch die Fähigkeit zur Bildung eines Schutzfilms von Hyaluronsäure kann die Wundheilung der Haut beschleunigt werden. Ferner unterstützen die Aminosäuren L-Prolin, L-Lysin, L-Leucin und Glycin die Kollagensynthese.

**Dosierung:**

Alle 1–3 Tage sollte der Verbandwechsel entsprechend dem Zustand der Wunde erfolgen.

**Anwendungshinweise, Vorsichtsmaßnahmen und Nebenwirkungen:**

Vulnamin® Salbe ist zur äußeren Anwendung geeignet.

Vor der Wundbehandlung die Hände gründlich reinigen. Etwaige Fremdkörper mit aufgesprühter Kochsalzlösung entfernen und dabei die Wunde von innen nach außen reinigen. Nach der Reinigung kann die Wunde mit sterilen Kompressen tamponiert werden, um evtl. ausgetretenes Blut zu entfernen. Anschließend die Salbe auftragen.

Trotz der guten Verträglichkeit können in seltenen Fällen lokale Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten, die wieder abklingen.

Es sind keine Nebenwirkungen und Überdosierungserscheinungen bekannt. Sollten dennoch Nebenwirkungen auftreten, muss die Behandlung abgebrochen und ein Arzt konsultiert werden. Bei gleichzeitiger Behandlung mit Arzneimitteln und/oder bei einer Behandlungsdauer über 6 Wochen sollte ebenfalls ein Arzt konsultiert werden. Während der Schwangerschaft und Stillzeit darf die Anwendung nur auf ärztliche Anweisung erfolgen.

Bei Überempfindlichkeit gegen die Inhaltsstoffe, darf Vulnamin® Salbe nicht angewendet werden.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

**Wechselwirkungen mit anderen Behandlungen:**

Es sind keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und Medizinprodukten bekannt.

**Lagerungshinweise:**

Bei 8–30 °C trocken und vor Sonneneinstrahlung / Wärme geschützt lagern. Nicht im Kühlschrank lagern.



**Vertreiber:**

Burg Pharma GmbH  
Wilhelmstraße 8  
06406 Bernburg,  
Deutschland

Zentrale Anforderung an:

Rote Liste Service GmbH

Fachinfo-Service

Mainzer Landstraße 55  
60329 Frankfurt