

Produktbeschreibung:

Mucosamin® Rektalgel ist ein Medizinprodukt gemäß der Richtlinie 93/42/EWG, das primär dem Schutz der Rektumschleimhaut dient. Die Hauptbestandteile Hyaluronsäure und verschiedene Aminosäuren unterstützen die Regeneration der Rektumschleimhaut durch Förderung der Kollagenbildung und des Aufbaus des Bindegewebes. Mucosamin® Rektalgel wird für die Therapie von strahlen- oder chemotherapiebedingten Schleimhautentzündungen im Enddarm (Proktitis) eingesetzt.

Darreichungsform:

Einweg-Geltuben mit Applikatoren

Inhaltsstoffe:

Gereinigtes Wasser, Natriumhyaluronat, Glycin, L-Prolin, L-Leucin, L-Lysin HCl, Methylparahydroxybenzoat, Propylparahydroxybenzoat, Propylenglycol

Indikation:

Mucosamin® Rektalgel ist für die Behandlung von Entzündungen der Rektumschleimhaut (Proktitis) im Rahmen von Strahlen-/Chemotherapie im Beckenbereich sowie kombinierten oder begleitenden Behandlungen indiziert. Die Anwendung von Mucosamin® Rektalgel unterstützt den Regenerationsprozess der Rektumschleimhaut resultierend in einer raschen Heilung. Mucosamin® Rektalgel wirkt schützend, schmerz- und reizlindernd.

Klinische Wirkungsweise:

Entzündungen der Rektumschleimhaut (Proktitis) infolge von Strahlen- / Chemotherapie können als symptomatische Nebenwirkung bei onkologischen Patienten aufgrund reduzierter Zellteilungsrate auftreten. Schwere Schleimhautentzündungen einhergehend mit Erythemen, Ulzera und brennenden Schmerzen können gravierende Auswirkungen auf die Lebensqualität haben.

Die wesentlichen Komponenten von Mucosamin® Rektalgel – Hyaluronsäure und ausgewählte Aminosäuren – unterstützen die Schleimhautregeneration, sodass Dauer und Schmerzintensität reduziert werden. Als Hauptbestandteil des Bindegewebes ist Hyaluronsäure durch eine ausgeprägte mukoadhäsente Eigenschaft und die Fähigkeit zur Bildung eines Schutzfilms charakterisiert. L-Prolin, L-Lysin, L-Leucin und Glycin begünstigen die Kollagensynthese und beschleunigen dadurch die Wundheilung.

Dosierung:

Einmal oder mehrmals täglich eine Tube je nach Schwere der Symptome und nach ärztlichem Ermessen anwenden.

Anwendungshinweise, Vorsichtsmaßnahmen und Nebenwirkungen:

Vor Anwendung von Mucosamin® Rektalgel den betreffenden Bereich gründlich reinigen. Schutzkappe des Applikators entfernen, den Applikator vorsichtig einführen und die Tube zusammendrücken, damit das Mucosamin® Rektalgel vollständig aus der Tube gelangt

und gleichmäßig verteilt wird. Um das Einführen zu erleichtern und die Schmerzen zu verringern, kann der Applikator vor Anwendung mit einer kleinen Menge Mucosamin® Rektalgel befeuchtet werden.

Mucosamin® Rektalgel zeichnet sich durch eine allgemein gute Verträglichkeit aus. Es sind keine Nebenwirkungen und Überdosierungserscheinungen bekannt. Sollten dennoch Nebenwirkungen oder lokale Reaktionen und Anzeichen einer Infektion (Schwellung, Erythem, Sekretion, Wärmegefühl oder Schmerzen) auftreten, muss die Behandlung abgebrochen und ein Arzt konsultiert werden. Während der Schwangerschaft und Stillzeit darf die Anwendung nur auf ärztliche Anweisung erfolgen.

Bei Überempfindlichkeit gegen die Inhaltsstoffe, darf Mucosamin® Rektalgel nicht angewendet werden.

Nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Wechselwirkungen mit anderen Behandlungen:

Es sind keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und Medizinprodukten bekannt.

Lagerungshinweise:

Bei 8–30 °C trocken und vor Sonneneinstrahlung / Wärme geschützt lagern. Nicht im Kühlschrank lagern.

**Vertreiber:**

Burg Pharma GmbH
Wilhelmstraße 8
06406 Bernburg,
Deutschland

Zentrale Anforderung an:

Rote Liste Service GmbH

Fachinfo-Service

Mainzer Landstraße 55
60329 Frankfurt