

## 1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS

Menveo Injektionslösung  
Meningokokken-Gruppen A-, C-, W-135- und Y-Konjugat-Impfstoff

## 2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE ZUSAMMENSETZUNG

Eine Dosis (0,5 ml) enthält:

- Meningokokken-Gruppe A-Oligosaccharid 10 Mikrogramm Konjugiert an *Corynebacterium diphtheriae* CRM<sub>197</sub>-Protein 16,7 bis 33,3 Mikrogramm
- Meningokokken-Gruppe C-Oligosaccharid 5 Mikrogramm Konjugiert an *Corynebacterium diphtheriae* CRM<sub>197</sub>-Protein 7,1 bis 12,5 Mikrogramm
- Meningokokken-Gruppe W-135-Oligosaccharid 5 Mikrogramm Konjugiert an *Corynebacterium diphtheriae* CRM<sub>197</sub>-Protein 3,3 bis 8,3 Mikrogramm
- Meningokokken-Gruppe Y-Oligosaccharid 5 Mikrogramm Konjugiert an *Corynebacterium diphtheriae* CRM<sub>197</sub>-Protein 5,6 bis 10,0 Mikrogramm

Vollständige Auflistung der sonstigen Bestandteile, siehe Abschnitt 6.1.

## 3. DARREICHUNGSFORM

Injektionslösung.

Die Lösung ist eine farblose, klare Flüssigkeit.

## 4. KLINISCHE ANGABEN

### 4.1 Anwendungsbereiche

Menveo ist angezeigt zur aktiven Immunisierung von Kindern (ab 2 Jahren), Jugendlichen und Erwachsenen, bei denen das Risiko einer Exposition gegenüber *Neisseria meningitidis* der Gruppen A, C, W-135 und Y besteht, um eine invasive Erkrankung zu vermeiden.

Die Anwendung dieses Impfstoffes sollte in Übereinstimmung mit den offiziellen Empfehlungen erfolgen.

### 4.2 Dosierung und Art der Anwendung

#### Dosierung

#### Kinder (ab 2 Jahren), Jugendliche und Erwachsene

Menveo sollte als Einzeldosis (0,5 ml) verabreicht werden.

Um optimale Antikörperspiegel gegen alle im Impfstoff enthaltenen Serogruppen zu gewährleisten, sollte die Grundimmunisierung mit Menveo einen Monat vor einer potenziellen Exposition gegenüber *Neisseria meningitidis* der Gruppen A, C, W-135 und Y abgeschlossen sein. Bakterizide Antikörper (hSBA  $\geq 1:8$ ) wurden eine Woche nach der Impfung bei mindestens 64 % der Probanden beobachtet (siehe Abschnitt 5.1 bzgl. Angaben zur Immunogenität gegenüber einzelnen Serogruppen).

#### Ältere Erwachsene und Senioren

Es liegen nur begrenzte Daten für ältere Erwachsene (im Alter von 56 bis 65 Jahren)

bzw. keine Daten für Senioren (im Alter von > 65 Jahren) vor.

#### Auffrischimpfung

Langzeitdaten zur Antikörperpersistenz nach der Impfung mit Menveo sind für einen Zeitraum von bis zu 5 Jahren nach der Impfung verfügbar (siehe Abschnitte 4.4 und 5.1).

Menveo kann Personen, die eine Grundimmunisierung mit Menveo, mit anderen Meningokokken-Konjugatimpfstoffen oder unkonjugierten Meningokokken-Polysaccharid-Impfstoffen erhalten haben, als Auffrischimpfung verabreicht werden. Bei zuvor mit Menveo geimpften Personen sind Notwendigkeit sowie Zeitpunkt für eine solche Auffrischimpfung entsprechend den nationalen Empfehlungen festzulegen.

#### Kinder (unter 2 Jahren)

Sicherheit und Wirksamkeit von Menveo konnten bei Kindern unter 2 Jahren noch nicht nachgewiesen werden. Derzeit verfügbare Daten sind im Abschnitt 5.1 beschrieben, allerdings können keine Empfehlungen zur Dosierung gemacht werden.

#### Art der Anwendung

Menveo wird durch intramuskuläre Injektion, vorzugsweise in den Deltamuskel, verabreicht.

Der Impfstoff darf nicht intravaskulär, subkutan oder intradermal injiziert werden.

Bei gleichzeitiger Verabreichung mit einem anderen Impfstoff müssen getrennte Injektionsstellen gewählt werden.

Hinweise zur Zubereitung des Arzneimittels vor der Anwendung, siehe Abschnitt 6.6.

### 4.3 Gegenanzeigen

Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der in Abschnitt 6.1 genannten sonstigen Bestandteile, oder Diphtherietoxoid (CRM<sub>197</sub>), oder eine lebensbedrohliche Reaktion nach der früheren Verabreichung eines Impfstoffes mit ähnlichen Komponenten (siehe Abschnitt 4.4).

Wie bei anderen Impfstoffen sollte die Impfung mit Menveo bei Personen mit schweren akuten, fieberhaften Erkrankungen verschoben werden. Das Vorliegen einer leichten Infektion ist jedoch keine Gegenanzeige.

### 4.4 Besondere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

#### Rückverfolgbarkeit

Um die Rückverfolgbarkeit biologischer Arzneimittel zu verbessern, müssen die Bezeichnung des Arzneimittels und die Chargenbezeichnung des angewendeten Arzneimittels eindeutig dokumentiert werden.

#### Überempfindlichkeit und Anaphylaxie

Vor der Injektion jedes Impfstoffes muss die für die Verabreichung verantwortliche Person alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen zur Verhinderung allergischer oder sonstiger Reaktionen treffen. Dazu gehört die Aufnahme einer gründlichen Anamnese sowie des aktuellen Gesundheitszustands. Wie bei allen injizierbaren Impfstoffen muss dafür gesorgt sein, dass für den Fall einer seltenen anaphylaktischen Reaktion nach Verabreichung des Impfstoffes eine entsprechende

medizinische Behandlung und Überwachung sofort verfügbar sind.

#### Angstbedingte Reaktionen

Angstbedingte Reaktionen, einschließlich vasovagaler Reaktionen (Synkope), Hyperventilation oder stressbedingte Reaktionen können als psychogene Reaktion auf die Injektion eines Impfstoffes auftreten (siehe Abschnitt 4.8). Im Vorfeld sollten geeignete Maßnahmen zur Vermeidung von Verletzungen im Falle einer Ohnmacht ergriffen werden.

Der Impfstoff darf unter keinen Umständen intravaskulär verabreicht werden.

#### Einschränkungen der Wirksamkeit

Menveo bietet keinen Schutz gegen Infektionen, die durch andere, nicht im Impfstoff enthaltene Serogruppen von *N. meningitidis* verursacht werden.

Wie bei jedem anderen Impfstoff kann es vorkommen, dass nicht bei allen geimpften Personen eine schützende Immunantwort hervorgerufen wird (siehe Abschnitt 5.1).

In Studien mit Menveo zeigte sich ein Rückgang der Titer bakterizider Serumantikörper gegen die Serogruppe A, wenn humanes Komplement im Test (hSBA) verwendet wurde (siehe Abschnitt 5.1). Die klinische Relevanz eines Zurückgehens der hSBA-Antikörpertiter der Serogruppe A ist nicht bekannt. Wenn zu erwarten ist, dass bei einer Person, die vor ungefähr über einem Jahr bereits eine Menveo-Dosis erhalten hat, ein erhöhtes Risiko einer Exposition gegenüber Men-A besteht, kann die Gabe einer Auffrischdosis in Erwägung gezogen werden.

Es liegen keine Daten hinsichtlich der Anwendbarkeit des Impfstoffes zur Prophylaxe nach erfolgter Exposition vor.

#### Personen mit geschwächter Immunabwehr

Bei Personen mit geschwächter Immunabwehr kann es sein, dass die Immunisierung nicht zu einer angemessenen Bildung von schützenden Antikörpern führt. Eine Infektion mit dem humanen Immundefizienzvirus (HIV) ist zwar keine Gegenanzeige, dennoch wurde Menveo bei immungeschwächten Personen nicht eigens evaluiert. Personen mit Komplementmangel und Personen mit funktioneller oder anatomischer Asplenie entwickeln möglicherweise keine Immunantwort auf Meningokokken-Gruppen A-, C-, W-135- und Y-Konjugat-Impfstoffe.

Personen mit angeborener Komplementdefizienz (zum Beispiel C3- oder C5-Mangel) sowie Personen, die mit Arzneimitteln behandelt werden, die die Aktivierung des terminalen Komplements hemmen (z. B. Eculizumab), haben ein erhöhtes Risiko einer durch *Neisseria meningitidis* der Gruppen A, C, W-135 und Y verursachten invasiven Erkrankung, auch wenn sie Antikörper nach der Impfung mit Menveo entwickeln.

#### Thrombozytopenie und Gerinnungsstörungen

Aufgrund des Risikos von Hämatomen wurde Menveo nicht bei Personen, die an Thrombozytopenie oder Blutungsstörungen leiden bzw. mit Antikoagulanzen behandelt werden, evaluiert. Der behandelnde Arzt muss das Nutzen-Risiko-Verhältnis bei Per-

# Menveo Injektionslösung

sonen, bei denen nach einer intramuskulären Injektion ein erhöhtes Hämatomrisiko besteht, abwägen.

#### Sonstiger Bestandteil mit bekannter Wirkung

##### **Natrium**

Dieses Arzneimittel enthält weniger als 1 mmol Natrium (23 mg) pro Dosis, d. h. es ist nahezu „natriumfrei“.

#### **4.5 Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstige Wechselwirkungen**

Menveo kann gleichzeitig mit jedem der folgenden Impfstoffe verabreicht werden: monovalente und kombinierte Hepatitis-A- und Hepatitis-B-Impfstoffe, Gelbfieber, Typhus (Vi-Polysaccharid), Japanische Enzephalitis, Tollwut und Meningokokken der Gruppe B (Bexsero).

Bei Jugendlichen (11 bis 18 Jahre) wurde Menveo in zwei Koadministrationsstudien entweder mit einem adsorbierten Kombinationsimpfstoff mit Tetanus-, reduzierter Diphtherie- und azellulärer Pertussiskomponente (Tdap) alleine oder mit Tdap und einem rekombinanten HPV-Vierfachimpfstoff gegen humane Papillomaviren (Typen 6, 11, 16 und 18) evaluiert. Beide Studien unterstützen die gleichzeitige Verabreichung der Impfstoffe.

Die Verabreichung von Menveo einen Monat nach einer Impfung mit Tdap führte zu statistisch signifikant geringeren Seroreaktionen gegen die Serogruppe W-135. Da keine direkte Auswirkung auf die Seroprotektionsrate beobachtet wurde, ist die klinische Bedeutung derzeit noch unbekannt. Es gab Hinweise auf eine gewisse Suppression der Antikörperreaktion auf zwei der drei Pertussis-Antigene. Die klinische Relevanz dieser Beobachtung ist nicht bekannt. Nach der Impfung hatten über 97 % der Probanden messbare Pertussis-Titer gegen alle drei Pertussis-Antigene.

Für Kinder im Alter zwischen 2 und 10 Jahren liegen keine Daten zur Bewertung der Sicherheit und Immunogenität von anderen Kinderimpfstoffen vor, wenn diese gleichzeitig mit Menveo verabreicht werden.

Die gleichzeitige Verabreichung von Menveo mit anderen, oben nicht angeführten Impfstoffen wurde nicht untersucht. Bei gleichzeitiger Verabreichung mit einem anderen Impfstoff müssen getrennte Injektionsstellen, vorzugsweise auf der gegenüberliegenden Körperseite, gewählt werden. Es sollte überprüft werden, ob die Nebenwirkungen durch die gleichzeitige Verabreichung eines anderen Impfstoffes verstärkt auftreten.

Die Immunantwort kann bei Patienten unter immunsuppressiver Behandlung vermindert sein.

#### **4.6 Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit**

Derzeit liegen nur unzureichende Daten zur Anwendung von Menveo in der Schwangerschaft vor.

In präklinischen Studien zeigte Menveo keine direkten oder indirekten schädlichen Wirkungen auf die Schwangerschaft, die Entwicklung des Embryos/Fötus, den Ge-

burtsvorgang und die postnatale Entwicklung. In Anbetracht der Tatsache, dass durch *Neisseria meningitidis*-Bakterien der Serogruppen A, C, W-135 und Y eine schwere invasive Meningokokken-Erkrankung verursacht werden kann, sollte eine Schwangerschaft kein Ausschlussgrund für eine Impfung sein, wenn ein klares Expositionsrisiko besteht.

Obwohl nur unzureichende klinische Daten zur Verwendung von Menveo während der Stillzeit vorliegen, ist es unwahrscheinlich, dass die in der Muttermilch ausgeschiedenen Antikörper für den Säugling schädlich sein könnten. Daher kann Menveo bei Frauen in der Stillzeit angewendet werden.

#### **4.7 Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**

Menveo hat keinen oder einen zu vernachlässigenden Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen. Einige der im Abschnitt 4.8 „Nebenwirkungen“ genannten Nebenwirkungen können jedoch die Verkehrstüchtigkeit sowie die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen vorübergehend beeinträchtigen.

#### **4.8 Nebenwirkungen**

##### Zusammenfassung des Nebenwirkungsprofils

Die am häufigsten berichteten Nebenwirkungen, die bei Personen im Alter von 2 Jahren und älter innerhalb von 7 Tagen nach der alleinigen Verabreichung einer Einzeldosis von Menveo auftraten, waren Schmerzen an der Injektionsstelle (42,7 %), Kopfschmerzen (26,4 %), Erythema an der Injektionsstelle  $\leq 50$  mm (18,1 %), Unwohlsein (17,3 %), Verhärtung an der Injektionsstelle  $\leq 50$  mm (15,1 %), Myalgie (13,5 %) und Reizbarkeit (11,3 %) bei Kindern im Alter von 2 bis 10 Jahren. Diese Nebenwirkungen waren überwiegend mild bis moderat ausgeprägt.

##### Tabellarische Liste der Nebenwirkungen

Die Sicherheit von Menveo bei Personen im Alter von 2 Jahren und älter wurde in 11 randomisierten Studien untersucht. 12 775 Personen wurden in die Sicherheitsanalysen eingeschlossen. Davon erhielten 3 334 Teilnehmende im Alter von 2 bis 10 Jahren und 9 441 Teilnehmende im Alter von 11 bis 65 Jahren Menveo in abgeschlossenen klinischen Studien.

Die nachfolgenden, in untenstehender Tabelle 1 gelisteten Nebenwirkungen wurden in klinischen Studien, in denen Menveo Personen im Alter von 2 Jahren und älter verabreicht wurde, und während der Anwendung nach der Markteinführung beobachtet.

Nebenwirkungen sind im Folgenden nach MedDRA-Systemorganklasse und Häufigkeit aufgeführt. Innerhalb jeder Häufigkeitsgruppe werden die Nebenwirkungen nach abnehmendem Schweregrad angegeben.

Sehr häufig	( $\geq 1/10$ )
Häufig	( $\geq 1/100$ , < 1/10)
Gelegentlich	( $\geq 1/1\,000$ , < 1/100)
Selten	( $\geq 1/10\,000$ , < 1/1 000)
Sehr selten	(< 1/10 000)

Nicht bekannt (Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar)

Siehe Tabelle 1 auf Seite 3

##### Meldung des Verdachts auf Nebenwirkungen

Die Meldung des Verdachts auf Nebenwirkungen nach der Zulassung ist von großer Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung des Nutzen-Risiko-Verhältnisses des Arzneimittels. Angehörige von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung über das nationale Meldesystem anzugeben:

Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel  
Paul-Ehrlich-Institut  
Paul-Ehrlich-Str. 51 – 59  
63225 Langen  
Tel: +49 6103 77 0  
Fax: +49 6103 77 1234  
Website: [www.pei.de](http://www.pei.de)

#### **4.9 Überdosierung**

Es wurden keine Fälle von Überdosierung berichtet.

#### **5. PHARMAKOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN**

##### **5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften**

Pharmakotherapeutische Gruppe: Meningokken-Impfstoffe, ATC-Code: J07AH08

##### Immunogenität von Menveo flüssig (Injektionslösung)

Die Immunogenität von Menveo flüssig, die in einer Beobachter-verblinden, randomisierten, multizentrischen, kontrollierten klinischen Phase 2b-Studie an Probanden im Alter von 10 bis 40 Jahren evaluiert wurde, in der die Nichtunterlegenheit von Menveo flüssig (für 24 und 30 Monate altes Produkt) gegenüber Menveo lyophilisiert/flüssig für Meningokokken der Serogruppe A (MenA) untersucht wurde, ist in Tabelle 2 dargestellt.

Die Nichtunterlegenheit von Menveo flüssig gegenüber Menveo lyophilisiert/flüssig wurde für MenA in Bezug auf die beiden co-primären Endpunkte der Studie nachgewiesen (Verhältnis der geometrischen Mitteltiter (GMTs) zwischen den beiden Gruppen 1 Monat nach der Impfung mit 24 und 30 Monate alter Formulierung).

Siehe Tabelle 2 auf Seite 4

##### Immunogenität von Menveo lyophilisiert/flüssig (Pulver und Lösung zur Herstellung einer Injektionslösung)

Durch die Messung der Produktion von Serogruppen-spezifischen antikapsulären Antikörpern mit bakterizider Aktivität wurde auf die Wirksamkeit von Menveo geschlossen. Die Titer bakterizider Antikörper im Serum (SBA) wurden unter Verwendung von Human-serum als Ausgangsmaterial für das exogene Komplement (hSBA) gemessen. Der hSBA war das ursprüngliche Korrelat für den Schutz gegen Meningokokken-Erkrankungen.

Die Immunogenität wurde in randomisierten, multizentrischen, aktiv kontrollierten klinischen Studien evaluiert, an denen Kinder (2–10 Jahre), Jugendliche (11–18 Jahre), Erwachsene (19–55 Jahre) und ältere Erwachsene (56–65 Jahre) teilnahmen.

**Tabelle 1: Nebenwirkungen**

Systemorganklasse	Häufigkeit	Nebenwirkungen
Erkrankungen des Blutes und des Lymphsystems	Gelegentlich	Lymphadenopathie <sup>1</sup>
Erkrankungen des Immunsystems	Gelegentlich	Überempfindlichkeit <sup>1</sup>
	Nicht bekannt	Anaphylaxie <sup>1</sup>
Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen	Häufig	Esstörung <sup>2</sup>
Erkrankungen des Nervensystems	Sehr häufig	Kopfschmerzen
	Häufig	Schläfrigkeit <sup>2</sup>
	Gelegentlich	Synkope <sup>1</sup> , Schwindelgefühl <sup>3</sup>
	Sehr selten	Tonische Konvulsion <sup>1</sup> , Fieberkampf <sup>1</sup>
Erkrankungen des Ohrs und des Labyrinths	Gelegentlich	Vertigo <sup>1</sup>
Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts	Häufig	Erbrechen <sup>2</sup> , Diarrhoe <sup>2</sup> , Übelkeit
Erkrankungen der Haut und des Unterhautgewebes	Häufig	Ausschlag
Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und Knochenerkrankungen	Sehr häufig	Myalgie
	Häufig	Arthralgie
Allgemeine Erkrankungen und Beschwerden am Verabreichungsort	Sehr häufig	Reizbarkeit <sup>2</sup> , Unwohlsein, Schmerzen an der Injektionsstelle, Erythem an der Injektionsstelle ( $\leq 50$ mm), Verhärtung an der Injektionsstelle ( $\leq 50$ mm)
	Häufig	Fieber ( $\geq 38$ °C), Schüttelfrost, Erythem an der Injektionsstelle ( $> 50$ mm), Verhärtung an der Injektionsstelle ( $> 50$ mm)
	Gelegentlich	Juckreiz an der Injektionsstelle, Schwellung an der Injektionsstelle <sup>1</sup>
	Sehr selten	Zellulitis an der Injektionsstelle <sup>1</sup> , ausgeprägte Schwellung der Extremität, an der die Injektion vorgenommen wurde <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Nebenwirkung berichtet während der Anwendung nach der Markteinführung<sup>2</sup> Berichtet bei Kindern im Alter von 2 bis 10 Jahren<sup>3</sup> Berichtet bei Personen im Alter von 11 bis 65 Jahren**Immunogenität bei Kindern von 2 bis 10 Jahren**

In der Hauptstudie V59P20 wurde die Immunogenität von Menveo mit ACWY-D verglichen. 1 170 Kinder wurden mit Menveo geimpft und 1 161 erhielten den Vergleichsimpfstoff in den Per-Protokoll-Populationen. In den zwei unterstützten Studien V59P8 und V59P10 wurde die Immunogenität von Menveo mit ACWY-PS verglichen.

In der randomisierten, Beobachter-verblindeten Hauptstudie V59P20, in der die Teilnehmenden nach dem Alter stratifiziert wurden (2 bis 5 Jahre und 6 bis 10 Jahre), wurde die Immunogenität einer Einzeldosis Menveo einen Monat nach der Impfung mit der Einzeldosis ACWY-D verglichen. Die Immunogenitätsergebnisse einen Monat nach der Immunisierung mit Menveo bei Probanden im Alter von 2–5 Jahren und 6–10 Jahren sind in untenstehender Tabelle 3 zusammengefasst.

Siehe Tabelle 3 auf Seite 5

In einer anderen randomisierten, Beobachter-verblindeten Studie (V59P8) wurden Kinder in den USA entweder mit einer Einzeldosis Menveo (N = 284) oder ACWY-PS (N = 285) immunisiert. Bei den Kindern im Alter von 2 bis 10 Jahren sowie in jeder Altersgruppe (im Alter von 2 bis 5 und 6 bis

10 Jahren) waren die Immunantwort, gemessen am Prozentsatz der Probanden mit einer Seroreaktion, hSBA  $\geq 1:8$  und GMT, dem Vergleichsimpfstoff ACWY-PS nicht nur nicht unterlegen, sondern alle diese Ergebnisse waren statistisch signifikant höher als die Vergleichswerte für alle Serogruppen und alle Immunmessungen einen Monat nach der Immunisierung. Ein Jahr nach der Impfung zeigte Menveo weiterhin statistisch signifikant höhere Ergebnisse als ACWY-PS hinsichtlich der Serogruppen A, W-135 und Y, gemessen am Prozentsatz von Probanden mit hSBA  $\geq 1:8$  sowie den GMT. Menveo war bezüglich dieser Endpunkte für die Serogruppe C nicht unterlegen (Tabelle 4). Die klinische Relevanz von höheren Immunantworten nach der Immunisierung ist nicht bekannt.

Siehe Tabelle 4 auf Seite 5

In einer randomisierten, Beobachter-verblindeten Studie (V59P10), die in Argentinien durchgeführt wurde, wurden Kinder entweder mit einer Einzeldosis Menveo (N = 949) oder ACWY-PS (N = 551) immunisiert. Die Immunogenität wurde in einer Untergruppe von 150 Probanden in jeder Impfstoffgruppe beurteilt. Die in der Altersgruppe der Zweibis Zehnjährigen beobachtete Immunantwort war sehr ähnlich wie jene, die in der oben gezeigten Studie V59P8 beobachtet wurde:

die Immunantwort auf Menveo war 1 Monat nach der Immunisierung, gemessen am Prozentsatz von Probanden mit einer Seroreaktion, hSBA  $\geq 1:8$  und GMT, jener auf ACWY-PS nicht unterlegen.

Eine randomisierte, Beobachter-verblindete Studie wurde bei Kindern zwischen 12 und 59 Monaten in Finnland und Polen durchgeführt (V59P7). Insgesamt befanden sich 199 Probanden zwischen 2 und 5 Jahren in der Menveo-per-Protokoll-Immunogenitätspopulation und 81 Probanden zwischen 3 und 5 Jahren in der ACWY-PS-Gruppe.

Einen Monat nach der ersten Impfung waren die Prozentsätze mit hSBA  $\geq 1:8$  in der Menveogruppe für alle vier Serogruppen konstant höher (63 % vs. 39 %, 46 % vs. 39 %, 78 % vs. 59 % bzw. 65 % vs. 57 % für Menveo, verglichen mit ACWY-PS für die Serogruppen A, C, W-135 bzw. Y).

In einer in den USA durchgeführten randomisierten, Beobachter-verblindeten Studie (V59\_57) wurde die Immunogenität einer 2-Dosen-Serie mit einer Einzeldosis von Menveo bei Kindern im Alter von 2 bis 5 Jahren sowie von 6 bis 10 Jahren verglichen (N = 715).

Vor der Impfung betrug der Prozentsatz von Probanden mit hSBA  $\geq 1:8$  in den beiden Altersgruppen 1 %–5 % für Serogruppe A, 13 %–28 % für Serogruppe C, 42 %–64 % für Serogruppe W-135 und 6 %–19 % für Serogruppe Y. Einem Monat nach der Impfung wurden für beide Altersgruppen in der 2-Dosen-Gruppe bzw. der Einzeldosisgruppe folgende Anteile von Probanden mit hSBA  $\geq 1:8$  nachgewiesen: 90 %–95 % bzw. 76 %–80 % für Serogruppe A, 98 %–99 % bzw. 76 %–87 % für Serogruppe C, 99 % bzw. 93 %–96 % für Serogruppe W-135 und 96 % bzw. 65 %–69 % für Serogruppe Y. In beiden Altersgruppen waren die GMT einen Monat nach der Impfung in der 2-Dosen-Gruppe höher als in der Einzeldosisgruppe; dieser Unterschied war jedoch in der Gruppe der älteren Probanden weniger ausgeprägt.

Ein Jahr nach der letzten Impfung waren die Anteile der Probanden mit hSBA  $\geq 1:8$  nach der 2-Dosen-Serie und der Einzeldosis jeweils niedriger als 1 Monat nach der Impfung (30 % nach der 2-Dosen-Serie bzw. 11 %–20 % nach der Einzeldosis für Serogruppe A; 61 %–81 % bzw. 41 %–55 % für Serogruppe C; 92 %–94 % bzw. 90 %–91 % für Serogruppe W-135; 67 %–75 % bzw. 57 %–65 % für Serogruppe Y). Die Unterschiede bei den hSBA-GMT zwischen der 2-Dosen-Gruppe und der Einzeldosisgruppe waren 1 Jahr nach der Impfung weniger ausgeprägt als 1 Monat nach der Impfung.

Der klinische Nutzen einer 2-Dosen-Impfserie bei Kindern im Alter von 2 bis 10 Jahren ist nicht bekannt.

**Persistenz der Immunantwort und Immunantwort auf eine Boosterdosis bei Kindern zwischen 2 und 10 Jahren**

5 Jahre nach der Grundimmunisierung wurde die Antikörpersustanz in der Studie V59P20E1 untersucht, die eine Erweiterung der Studie V59P20 darstellt. Antikörpersustanz gegen die Serogruppen C, W-135 und Y konnte nachgewiesen werden, wobei

# Menveo Injektionslösung

**Tabelle 2: Bakterizide Antikörperantworten im Serum von Probanden im Alter von 10 bis 40 Jahren, die entweder Menveo flüssig oder die Menveo lyophilisierte/flüssige Formulierung erhielten, 1 Monat nach der Impfung**

Studie (Produktalter von Menveo flüssig)	Endpunkt nach Serogruppe	Menveo flüssig (95 % KI)	Menveo lyophilisiert/ flüssig (95 % KI)	Menveo flüssig / Menveo lyophilisiert/ flüssig (95 % KI)	Menveo flüssig minus Menveo lyophilisiert/ flüssig (95 % KI)
<b>V59_78 (24 Monate)**</b>	<b>A</b>	N = 363	N = 373		
	GMT	386,66 (319,47; 467,97)	318,34 (264,14; 383,67)	1,21 (0,94; 1,57)*	-
	% hSBA ≥ 1:8	93,65 (90,70; 95,89) N = 378	92,19 (89,03; 94,67) N = 384	-	1,46 (-2,24; 5,22)
	<b>C</b>	N = 385	N = 377		
	GMT	143,48 (110,49; 186,30)	171,74 (131,74; 223,87)	0,84 (0,58; 1,19)	-
	% hSBA ≥ 1:8	77,58 (73,10; 81,63) N = 388	78,01 (73,52; 82,06) N = 382	-	-0,43 (-6,32; 5,46)
	<b>W-135</b>	N = 372	N = 388		
	GMT	62,63 (50,99; 76,92)	66,37 (54,26; 81,18)	0,94 (0,72; 1,24)	-
	% hSBA ≥ 1:8	79,43 (75,07; 83,34) N = 389	80,87 (76,62; 84,64) N = 392	-	-1,43 (-7,05; 4,18)
	<b>Y</b>	N = 379	N = 390		
<b>V59_78 (30 Monate)***</b>	<b>A</b>	N = 356	N = 349		
	GMT	387,06 (322,72; 464,24)	348,89 (290,09; 419,61)	1,11 (0,87; 1,42)*	-
	% hSBA ≥ 1:8	93,37 (90,37; 95,66) N = 377	94,01 (91,06; 96,21) N = 367	-	-0,64 (-4,24; 2,96)
	<b>C</b>	N = 376	N = 377		
	GMT	256,70 (195,29; 337,41)	226,09 (171,62; 297,85)	1,14 (0,79; 1,64)	-
	% hSBA ≥ 1:8	84,17 (80,10; 87,70) N = 379	82,85 (78,67; 86,51) N = 379	-	1,32 (-3,99; 6,64)
	<b>W-135</b>	N = 374	N = 366		
	GMT	83,23 (68,19; 101,60)	75,42 (61,56; 92,41)	1,10 (0,84; 1,45)	-
	% hSBA ≥ 1:8	85,86 (82,00; 89,17) N = 389	81,77 (77,54; 85,50) N = 384	-	4,09 (-1,11; 9,33)
	<b>Y</b>	N = 386	N = 377		
	GMT	112,38 (91,56; 137,92)	117,56 (95,39; 144,89)	0,96 (0,72; 1,26)	-
	% hSBA ≥ 1:8	88,04 (84,42; 91,08) N = 393	87,56 (83,85; 90,69) N = 386	-	0,48 (-4,16; 5,13)

\* Das Kriterium der Nichtunterlegenheit ist erfüllt (die untere Grenze des zweiseitigen 95 %-KI > 0,5 für das Verhältnis der GMTs zwischen den Gruppen an Tag 29 [Menveo flüssig / Menveo lyophilisiert/flüssig]).

\*\* bezieht sich auf Teil 1 der Studie V59\_78, in der 24 Monate altes Menveo flüssig benutzt wurde.

\*\*\* bezieht sich auf Teil 2 der Studie V59\_78, in der 30 Monate altes Menveo flüssig benutzt wurde.

die Anteile der Patienten mit hSBA ≥ 1:8 bei Probanden im Alter zwischen 2 und 5 Jahren sowie zwischen 6 und 10 Jahren gegen die Serogruppe C bei 32 % bzw. 56 %, gegen die Serogruppe W-135 bei 74 % bzw. 80 % und gegen die Serogruppe Y bei 48 % bzw. 53 % lagen. Die entsprechenden GMTs lagen für die Serogruppe C bei 6,5 bzw. 12, für die

Serogruppe W-135 bei 19 bzw. 26 sowie für die Serogruppe Y bei 8,13 bzw. 10. Für die Serogruppe A hatten 14 % bzw. 22 % der Probanden im Alter zwischen 2 und 5 Jahren bzw. zwischen 6 bis 10 Jahren hSBA ≥ 1:8 (GMTs: 2,95 bzw. 3,73). 5 Jahre nach der Grundimmunisierung mit einer Einzeldosis erhielten die Kinder eine

Boosterdosis Menveo. Alle Probanden beider Altersgruppen hatten hSBA ≥ 1:8 gegen alle Serogruppen; die entsprechenden Antikörper-Titer waren im Vergleich zu denjenigen nach der Grundimmunisierung um ein Mehrfaches höher (Tabelle 5).

Siehe Tabelle 5 auf Seite 5

# Menveo Injektionslösung

**Tabelle 3: Bakterizide Antikörperantworten im Serum von Probanden im Alter von 2–5 Jahren und 6–10 Jahren einen Monat nach Immunisierung mit Menveo**

Serogruppe	2–5 Jahre		6–10 Jahre	
	hSBA $\geq 1:8$ (95 % KI)	hSBA-GMT (95 % KI)	hSBA $\geq 1:8$ (95 % KI)	hSBA-GMT (95 % KI)
<b>A</b>	N = 606	N = 606	N = 551	N = 551
	72 % (68; 75)	26 (22; 30)	77 % (74; 81)	35 (29; 42)
<b>C</b>	N = 607	N = 607	N = 554	N = 554
	68 % (64; 72)	18 (15; 20)	77 % (73; 80)	36 (29; 45)
<b>W-135</b>	N = 594	N = 594	N = 542	N = 542
	90 % (87; 92)	43 (38; 50)	91 % (88; 93)	61 (52; 72)
<b>Y</b>	N = 593	N = 593	N = 545	N = 545
	76 % (72; 79)	24 (20; 28)	79 % (76; 83)	34 (28; 41)

*Immunogenität bei Personen ab 11 Jahren*

In der Hauptstudie (V59P13) erhielten Jugendliche und Erwachsene entweder eine Dosis Menveo (N = 2 649) oder ACWY-D als Vergleichsimpfstoff (N = 875). Serumproben wurden sowohl vor als auch 1 Monat nach der Impfung genommen.

In einer anderen Studie (V59P6), die an 524 Jugendlichen durchgeführt wurde, wurde die Immunogenität von Menveo mit jener von Meningokokken-Polysaccharid-Vierfachimpfstoff (ACWY-PS) verglichen.

*Immunogenität bei Jugendlichen*

In der Altersgruppe der 11–18-jährigen Probanden wurde in der Hauptstudie V59P13 die Immunogenität einer Menveo-Einzeldosis einen Monat nach Impfung mit ACWY-D verglichen. Die Ergebnisse der Immunogenität, einen Monat nach Verabreichung von Menveo, sind in nachfolgender Tabelle 6 zusammengefasst.

Siehe Tabelle 6 auf Seite 6

**Tabelle 4: Immunogenität einer Dosis Menveo oder ACWY-PS bei Probanden im Alter von 2 bis 10 Jahren, gemessen einen Monat und zwölf Monate nach der Impfung**

Serogruppe	1 Monat nach der Impfung				12 Monate nach der Impfung			
	hSBA $\geq 1:8$ (95 % KI)		hSBA-GMT (95 % KI)		hSBA $\geq 1:8$ (95 % KI)		hSBA-GMT (95 % KI)	
	Menveo	ACWY-PS	Menveo	ACWY-PS	Menveo	ACWY-PS	Menveo	ACWY-PS
<b>A</b>	N = 280	N = 281	N = 280	N = 281	N = 253	N = 238	N = 253	N = 238
	79 % (74; 84)	37 % (31; 43)	36 (30; 44)	6,31 (5,21; 7,64)	23 % (18; 29)	13 % (9; 18)	3,88 (3,39; 4,44)	3 (2,61; 3,44)
<b>C</b>	N = 281	N = 283	N = 281	N = 283	N = 252	N = 240	N = 252	N = 240
	73 % (68; 78)	54 % (48; 60)	26 (21; 34)	15 (12; 20)	53 % (47; 59)	44 % (38; 51)	11 (8,64; 13)	9,02 (7,23; 11)
<b>W-135</b>	N = 279	N = 282	N = 279	N = 282	N = 249	N = 237	N = 249	N = 237
	92 % (88; 95)	66 % (60; 71)	60 (50; 71)	14 (12; 17)	90 % (86; 94)	45 % (38; 51)	42 (35; 50)	7,57 (6,33; 9,07)
<b>Y</b>	N = 280	N = 282	N = 280	N = 282	N = 250	N = 239	N = 250	N = 239
	88 % (83; 91)	53 % (47; 59)	54 (44; 66)	11 (9,29; 14)	77 % (71; 82)	32 % (26; 38)	27 (22; 33)	5,29 (4,34; 6,45)

**Tabelle 5: Persistenz der Immunantwort 5 Jahre nach der Grundimmunisierung mit Menveo und Immunantworten 1 Monat nach einer Boosterdosis bei Probanden im Alter zwischen 2 und 5 Jahren sowie zwischen 6 und 10 Jahren zum Zeitpunkt der Grundimmunisierung**

Serogruppe	2–5 Jahre				6–10 Jahre			
	Persistenz nach 5 Jahren		1 Monat nach der Boosterdosis		Persistenz nach 5 Jahren		1 Monat nach der Boosterdosis	
	hSBA $\geq 1:8$ (95 % KI)	hSBA-GMT (95 % KI)	hSBA $\geq 1:8$ (95 % KI)	hSBA-GMT (95 % KI)	hSBA $\geq 1:8$ (95 % KI)	hSBA-GMT (95 % KI)	hSBA $\geq 1:8$ (95 % KI)	hSBA-GMT (95 % KI)
<b>A</b>	N = 96	N = 96	N = 95	N = 95	N = 64	N = 64	N = 60	N = 60
	14 % (7; 22)	2,95 (2,42; 3,61)	100 % (96; 100)	361 (299; 436)	22 % (13; 34)	3,73 (2,74; 5,06)	100 % (94; 100)	350 (265; 463)
<b>C</b>	N = 96	N = 96	N = 94	N = 94	N = 64	N = 64	N = 60	N = 60
	32 % (23; 43)	6,5 (4,75; 8,9)	100 % (96; 100)	498 (406; 610)	56 % (43; 69)	12 (7,72; 19)	100 % (94; 100)	712 (490; 1 036)
<b>W-135</b>	N = 96	N = 96	N = 95	N = 95	N = 64	N = 64	N = 60	N = 60
	74 % (64; 82)	19 (14; 25)	100 % (96; 100)	1 534 (1 255; 1 873)	80 % (68; 89)	26 (18; 38)	100 % (94; 100)	1 556 (1 083; 2 237)
<b>Y</b>	N = 96	N = 96	N = 94	N = 94	N = 64	N = 64	N = 59	N = 59
	48 % (38; 58)	8,13 (6,11; 11)	100 % (96; 100)	1 693 (1 360; 2 107)	53 % (40; 66)	10 (6,51; 16)	100 % (94; 100)	1 442 (1 050; 1 979)

# Menveo Injektionslösung



In der Untergruppe der 11–18-jährigen Probanden mit seronegativen Ausgangswerten ( $hSBA < 1:4$ ) war der Anteil der Personen, die nach einer Dosis von Menveo einen  $hSBA$  von  $\geq 1:8$  erreichten, wie folgt: Serogruppe A 75 % (780/1 039); Serogruppe C 80 % (735/923); Serogruppe W-135 94 % (570/609); Serogruppe Y 81 % (510/630).

In der Nicht-Unterlegenheitsstudie V59P6 wurde die Immunogenität bei Jugendlichen zwischen 11 und 17 Jahren beurteilt, die randomisiert entweder Menveo oder ACWY-PS erhielten. Im Hinblick auf alle vier Serogruppen (A, C, W-135 und Y) erwies sich Menveo gegenüber dem ACWY-PS-Impfstoff als nicht unterlegen. Die Daten basieren auf der Seroreaktion, dem Prozentsatz, der  $hSBA$  von  $\geq 1:8$  erreichte, sowie den GMT (Tabelle 7).

Siehe Tabelle 7

Ein Jahr nach der Impfung zeigte sich in derselben Probandengruppe, dass ein höherer Prozentsatz der mit Menveo immunisierten Personen  $hSBA \geq 1:8$  für die Serogruppen C, W-135 und Y aufwiesen, verglichen mit ACWY-PS. Für die Serogruppe A zeigten beide Gruppen vergleichbare Werte. Ähnliche Ergebnisse wurden im Vergleich der  $hSBA$ -GMT beobachtet.

#### Persistenz der Immunantwort und Immunantwort auf eine Boosterdosis bei Jugendlichen

In der Studie V59P13E1 wurde die Persistenz der Immunantwort gegen die Serogruppen A, C, W-135 und Y 21 Monate, 3 Jahre und 5 Jahre nach der Grundimmunisierung untersucht, wobei die Probanden zum Zeitpunkt der Impfung zwischen 11 und 18 Jahre alt waren. Der Anteil von Probanden mit  $hSBA \geq 1:8$  gegen die Serogruppen C, W-135 und Y blieb in der Menveo-Gruppe 21 Monate bis 5 Jahre nach der Impfung konstant. Hinsichtlich der Serogruppe A sank er mit der Zeit leicht ab (Tabelle 8). 5 Jahre nach der Grundimmunisierung war der Anteil der Probanden mit  $hSBA \geq 1:8$  gegen alle vier Serogruppen in der Menveo-Gruppe deutlich höher als in der Kontrollgruppe mit ungeimpften Probanden.

Siehe Tabelle 8

3 Jahre nach der Grundimmunisierung mit Menveo oder ACWY-D wurde eine Boosterdosis Menveo verabreicht. Einen Monat nach der Auffrischimpfung mit Menveo zeigten beide Gruppen eine starke Immunantwort (100 % der Probanden hatten  $hSBA \geq 1:8$  gegen alle Serogruppen), die im Verlauf von 2 Jahren nach der Auffrischimpfung hinsichtlich der Serogruppen C, W-135 und Y (87 bis 100 % der Probanden mit  $hSBA \geq 1:8$  gegen die verschiedenen Serogruppen) anhielt. Der Anteil von Probanden mit  $hSBA \geq 1:8$  gegen die Serogruppe A war leicht rückläufig, jedoch mit 77 bis 79 % immer noch hoch. Die GMT gingen mit der Zeit wie erwartet zurück, waren jedoch immer noch 2- und 8-mal höher als die Werte vor der Auffrischimpfung (Tabelle 10).

In der Studie V59P6E1 war ein Jahr nach der Impfung mit Menveo der Anteil der Probanden mit  $hSBA \geq 1:8$  gegen die Serogruppen C, W-135 und Y deutlich höher als ein Jahr nach der Impfung mit einem ACWY-PS-Impfstoff.

**Tabelle 6: Bakterizide Antikörperantworten im Serum von Probanden zwischen 11 und 18 Jahren einen Monat nach Immunisierung mit Menveo**

Serogruppe	N	GMT (95 % KI)	$hSBA \geq 1:8$ (95 % KI)
<b>A</b>	1 075	29 (24; 35)	75 % (73; 78)
<b>C</b>	1 396	50 (39; 65)	85 % (83; 87)
<b>W-135</b>	1 024	87 (74; 102)	96 % (95; 97)
<b>Y</b>	1 036	51 (42; 61)	88 % (85; 90)

**Tabelle 7: Immunogenität einer Dosis von Menveo oder ACWY-PS bei Jugendlichen, gemessen einen Monat nach der Impfung**

Serogruppe	$hSBA \geq 1:8$ (95 % KI)		hSBA-GMT (95 % KI)	
	Menveo	ACWY-PS	Menveo	ACWY-PS
<b>A</b>	N = 140	N = 149	N = 140	N = 149
	81 % (74; 87)	41 % (33; 49)	33 (25; 44)	7,31 (5,64; 9,47)
<b>C</b>	N = 140	N = 147	N = 140	N = 147
	84 % (77; 90)	61 % (53; 69)	59 (39; 89)	28 (19; 41)
<b>W-135</b>	N = 138	N = 141	N = 138	N = 141
	91 % (84; 95)	84 % (77; 89)	48 (37; 62)	28 (22; 36)
<b>Y</b>	N = 139	N = 147	N = 139	N = 147
	95 % (90; 98)	82 % (75; 88)	92 (68; 124)	35 (27; 47)

**Tabelle 8: Persistenz der Immunantwort ungefähr 21 Monate, 3 Jahre und 5 Jahre nach der Impfung mit Menveo (die Probanden waren zum Zeitpunkt der Impfung 11 bis 18 Jahre alt)**

Serogruppe	Zeitpunkt	Anteil der Probanden (%) mit $hSBA \geq 1:8$		hSBA-GMT
		Menveo	Menveo	
<b>A</b>		N = 100	N = 100	
	21 Monate	45 (35; 55)		6,57 (4,77–9,05)
	3 Jahre	38 (28; 48)		5,63 (3,97–7,99)
	5 Jahre	35 (26; 45)		4,43 (3,13–6,26)
<b>C</b>		N = 100	N = 100	
	21 Monate	61 (51; 71)		11 (8,12–15)
	3 Jahre	68 (58; 77)		16 (11–25)
	5 Jahre	64 (54; 73)		14 (8,83–24)
<b>W-135</b>		N = 99	N = 99	
	21 Monate	86 (77; 92)		18 (14–25)
	3 Jahre	85 (76; 91)		31 (21–46)
	5 Jahre	85 (76; 91)		32 (21–47)
<b>Y</b>		N = 100	N = 100	
	21 Monate	71 (61; 80)		14 (10–19)
	3 Jahre	69 (59; 78)		14 (9,68–20)
	5 Jahre	67 (57; 76)		13 (8,8–20)

Hinsichtlich der Serogruppe A war der Anteil in beiden Gruppen vergleichbar. Die hSBA-GMT für die Serogruppen W-135 und Y waren bei den Probanden, die Menveo erhalten hatten, höher. 5 Jahre nach der Impfung mit Menveo war der Anteil der Probanden mit hSBA  $\geq 1:8$  für die Serogruppen C und Y deutlich höher als bei denjenigen, die 5 Jahre zuvor mit ACWY-PS geimpft wurden. Höhere hSBA-GMT wurden für die Serogruppen W-135 und Y beobachtet (Tabelle 9).

Siehe Tabelle 9

5 Jahre nach der Grundimmunisierung mit Menveo oder ACWY-PS wurde eine Auffrischimpfung mit Menveo verabreicht. 7 Tage nach der Auffrischimpfung erreichten 98 bis 100 % der Probanden, die zuvor Menveo erhalten hatten, und 73 bis 84 %

der Probanden, die ACWY-PS erhalten haben, einen hSBA  $\geq 1:8$  gegen die Serogruppen A, C, W-135 und Y. Einen Monat nach der Impfung lag der Anteil der Probanden mit hSBA  $\geq 1:8$  bei jeweils 98 bis 100 % bzw. 84 bis 96 %.

Ein signifikanter Anstieg der hSBA-GMT gegen alle vier Serogruppen wurde ebenfalls 7 und 28 Tage nach der Auffrischimpfung beobachtet (Tabelle 10).

Siehe Tabelle 10

#### *Immunogenität bei Erwachsenen*

In der Hauptstudie zur Immunogenität, V59P13, wurden die Immunantworten auf Menveo bei Erwachsenen zwischen 19 und 55 Jahren beurteilt. Die Ergebnisse werden in Tabelle 11 präsentiert. In der Untergruppe

der Probanden zwischen 19 und 55 Jahren, die bei der Ausgangsuntersuchung seronegativ waren, war der Prozentsatz der Personen, die nach einer Menveo-Dosis einen hSBA von  $\geq 1:8$  erreichten, wie folgt: Serogruppe A 67 % (582/875); Serogruppe C 71 % (401/563); Serogruppe W-135 82 % (131/160); Serogruppe Y 66 % (173/263).

Siehe Tabelle 11 auf Seite 8

Das Einsetzen der Immunantwort nach der Grundimmunisierung mit Menveo bei gesunden Probanden im Alter von 18 bis 22 Jahren wurde in der Studie V59P6E1 untersucht. 7 Tage nach der Impfung zeigten 64 % der Probanden hSBA  $\geq 1:8$  gegen die Serogruppe A und 88 bis 90 % der Probanden hatten bakterizide Antikörperantworten gegen die Serogruppen C, W-135 und Y. Einen Monat

**Tabelle 9: Persistenz der Immunantwort ungefähr 12 Monate und 5 Jahre nach der Impfung mit Menveo bzw. ACWY-PS (die Probanden waren zum Zeitpunkt der Impfung 11 bis 18 Jahre alt)**

Serogruppe	Zeitpunkt	Anteil der Probanden mit hSBA $\geq 1:8$			hSBA-GMT		
		Menveo	ACWY-PS	p-Wert Menveo vs. ACWY-PS	Menveo	ACWY-PS	p-Wert Menveo vs. ACWY-PS
A		N = 50	N = 50		N = 50	N = 50	
	12 Monate	41 % (27; 56)	43 % (28; 59)	0,73	5,19 (3,34; 8,09)	6,19 (3,96; 9,66)	0,54
	5 Jahre	30 % (18; 45)	44 % (30; 59)	0,15	5,38 (3,29; 8,78)	7,75 (4,83; 12)	0,24
C		N = 50	N = 50		N = 50	N = 50	
	12 Monate	82 % (68; 91)	52 % (37; 68)	< 0,001	29 (15; 57)	17 (8,55; 33)	0,22
	5 Jahre	76 % (62; 87)	62 % (47; 75)	0,042	21 (12; 37)	20 (12; 35)	0,92
W-135		N = 50	N = 50		N = 50	N = 50	
	12 Monate	92 % (80; 98)	52 % (37; 68)	< 0,001	41 (26; 64)	10 (6,41; 16)	< 0,001
	5 Jahre	72 % (58; 84)	56 % (41; 70)	0,093	30 (18; 52)	13 (7,65; 22)	0,012
Y		N = 50	N = 50		N = 50	N = 50	
	12 Monate	78 % (63; 88)	50 % (35; 65)	0,001	34 (20; 57)	9,28 (5,5; 16)	< 0,001
	5 Jahre	76 % (62; 87)	50 % (36; 64)	0,002	30 (18; 49)	8,25 (5,03; 14)	< 0,001

**Tabelle 10: Immunantwort auf die Auffrischimpfung: Bakterizide Antikörperantworten nach der Auffrischimpfung mit Menveo, 3 oder 5 Jahre nach der Grundimmunisierung mit Menveo oder ACWY-PS bei Probanden im Alter von 11 bis 17 Jahren**

Serogruppe	Zeitpunkt	Anteil der Probanden mit hSBA $\geq 1:8$			hSBA-GMT		
		V59P13E1 (3 Jahre nach der Impfung)	V59P6E1 (5 Jahre nach der Impfung)		V59P13E1 (3 Jahre nach der Impfung)	V59P6E1 (5 Jahre nach der Impfung)	
			Menveo	Menveo		Menveo	ACWY-PS
A		N = 42	N = 49	N = 49	N = 42	N = 49	N = 49
	Vor der Auffrischimpfung	21 % (10; 37)	29 % (17; 43)	43 % (29; 58)	2,69 (1,68; 4,31)	5,16 (3,46; 7,7)	7,31 (4,94; 11)
	7 Tage	-	100 % (93; 100)	73 % (59; 85)	-	1 059 (585; 1 917)	45 (25; 80)
	28 Tage	100 % (92; 100)	98 % (89; 100)	94 % (83; 99)	326 (215; 494)	819 (514; 1 305)	147 (94; 232)
	2 Jahre	79 % (63; 90)	-	-	22 (12; 41)	-	-

Fortsetzung der Tabelle auf Seite 8

# Menveo Injektionslösung



Fortsetzung der Tabelle 10

Serogruppe	Zeitpunkt	Anteil der Probanden mit hSBA $\geq 1:8$			hSBA-GMT		
		V59P13E1 (3 Jahre nach der Impfung)		V59P6E1 (5 Jahre nach der Impfung)	V59P13E1 (3 Jahre nach der Impfung)	V59P6E1 (5 Jahre nach der Impfung)	
		Menveo	Menveo	ACWY-PS	Menveo	Menveo	ACWY-PS
C		N = 42	N = 49	N = 49	N = 42	N = 49	N = 49
	Vor der Auffrischimpfung	55 % (39; 70)	78 % (63; 88)	61 % (46; 75)	16 (8,66; 31)	20 (13; 33)	19 (12; 31)
	7 Tage	-	100 % (93; 100)	78 % (63; 88)	-	1 603 (893; 2 877)	36 (20; 64)
	28 Tage	100 % (92; 100)	100 % (93; 100)	84 % (70; 93)	597 (352; 1 014)	1 217 (717; 2 066)	51 (30; 86)
	2 Jahre	95 % (84; 99)	-	-	124 (62; 250)	-	-
W-135		N = 41	N = 49	N = 49	N = 41	N = 49	N = 49
	Vor der Auffrischimpfung	88 % (74; 96)	73 % (59; 85)	55 % (40; 69)	37 (21; 65)	29 (17; 49)	12 (7,02; 19)
	7 Tage	-	100 % (93; 100)	84 % (70; 93)	-	1 685 (1 042; 2 725)	34 (21; 54)
	28 Tage	100 % (91; 100)	100 % (93; 100)	92 % (80; 98)	673 (398; 1 137)	1 644 (1 090; 2 481)	47 (32; 71)
	2 Jahre	100 % (91; 100)	-	-	93 (58; 148)	-	-
Y		N = 42	N = 49	N = 49	N = 42	N = 49	N = 49
	Vor der Auffrischimpfung	74 % (58; 86)	78 % (63; 88)	51 % (36; 66)	14 (8,15; 26)	28 (18; 45)	7,8 (4,91; 12)
	7 Tage	-	98 % (89; 100)	76 % (61; 87)	-	2 561 (1 526; 4 298)	21 (13; 35)
	28 Tage	100 % (92; 100)	100 % (93; 100)	96 % (86; 100)	532 (300; 942)	2 092 (1 340; 3 268)	63 (41; 98)
	2 Jahre	95 % (84; 99)	-	-	55 (30; 101)	-	-

nach der Impfung erreichten 92 bis 98 % der Probanden einen hSBA  $\geq 1:8$  gegen die Serogruppen A, C, W-135 und Y. Eine starke Immunantwort, nachgewiesen mittels hSBA-GMT gegen alle Serogruppen, wurde ebenfalls 7 (GMT 34 bis 70) und 28 Tage (GMT 79 bis 127) nach der Verabreichung einer Dosis des Impfstoffes beobachtet.

#### Immunogenität bei älteren Erwachsenen (im Alter von 56 bis 65 Jahren)

Die Immunogenität von Menveo im Vergleich mit ACWY-PS wurde bei Probanden im Alter zwischen 56 und 65 Jahren in der Studie V59P17 evaluiert. Der Prozentsatz der Probanden mit hSBA  $\geq 1:8$  war gegenüber ACWY-PS hinsichtlich aller Serogruppen nicht unterlegen und hinsichtlich der Serogruppen A und Y statistisch überlegen (Tabelle 12).

Siehe Tabelle 12

#### Verfügbare Daten bei Kindern zwischen 2 und 23 Monaten

Die Immunogenität von Menveo bei Kindern zwischen 2 und 23 Monaten ist im Rahmen mehrerer Studien untersucht worden. Obwohl ein hoher Prozentsatz der Probanden, die 4 Dosen Menveo erhalten hatten, hSBA-Titer über 1:8 erreichten – der Prozentsatz nach der Verabreichung von 2 Dosen Menveo oder nur einer Dosis Menveo war geringer –, wurde Menveo lediglich im Rahmen einer Hauptstudie mit einem ande-

**Tabelle 11: Bakterizide Antikörperantworten im Serum von Probanden zwischen 19 und 55 Jahren einen Monat nach Immunisierung mit Menveo**

Serogruppe	N	GMT (95 % KI)	hSBA $\geq 1:8$ (95 % KI)
A	963	31 (27; 36)	69 % (66; 72)
C	902	50 (43; 59)	80 % (77; 83)
W-135	484	111 (93; 132)	94 % (91; 96)
Y	503	44 (37; 52)	79 % (76; 83)

**Tabelle 12: Immunogenität einer Dosis von Menveo oder ACWY-PS bei Erwachsenen zwischen 56 und 65 Jahren, gemessen einen Monat nach der Impfung**

Serogruppe	Menveo hSBA $\geq 1:8$ (95 % KI)	ACWY-PS hSBA $\geq 1:8$ (95 % KI)
A	N = 83	N = 41
	87 % (78; 93)	63 % (47; 78)
C	N = 84	N = 41
	90 % (82; 96)	83 % (68; 93)
W-135	N = 82	N = 39
	94 % (86; 98)	95 % (83; 99)
Y	N = 84	N = 41
	88 % (79; 94)	68 % (52; 82)

ren Meningokokken-Impfstoff verglichen, in der es keine Immunantwort zeigen konnte, die mindestens gleich stark war wie die eines monovalenten Impfstoffes gegen die Serogruppe C (nach Verabreichung einer einzelnen Dosis im Alter von 12 Monaten). Derzeit vorliegende Daten sind nicht ausreichend, um die Wirksamkeit von Menveo bei Kindern unter 2 Jahren aufzuzeigen. Für Informationen zur Anwendung bei Kindern und Jugendlichen siehe Abschnitt 4.2.

## 5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Nicht zutreffend.

## 5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Basierend auf den konventionellen Studien zur Toxizität bei wiederholter Gabe sowie zur Reproduktions- und Entwicklungstoxizität lassen die präklinischen Daten keine besonderen Gefahren für den Menschen erkennen.

In Tierversuchen mit Kaninchen wurden keine unerwünschten Reaktionen bei geimpften Muttertieren oder deren Nachkommen bis zum 29. Tag nach der Geburt beobachtet.

Bei weiblichen Kaninchen, die Menveo vor der Paarung und während der Schwangerschaft erhielten, wurden keine Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit beobachtet.

## 6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

### 6.1 Liste der sonstigen Bestandteile

Natriumdihydrogenphosphat-Monohydrat  
Dinatriumhydrogenphosphat-Dihydrat  
Natriumchlorid  
Wasser für Injektionszwecke

### 6.2 Inkompatibilitäten

Da keine Kompatibilitätsstudien durchgeführt wurden, darf dieses Arzneimittel nicht mit anderen Arzneimitteln gemischt werden.

### 6.3 Dauer der Haltbarkeit

2 Jahre

### 6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Aufbewahrung

Im Kühlschrank lagern (2 °C – 8 °C). Nicht einfrieren.

Die Durchstechflasche(n) im Umschlag aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

Stabilitätsdaten zeigen, dass der Impfstoff in der ungeöffneten Durchstechflasche bei Lagerung bei 25 °C bis zu 24 Stunden stabil ist. Am Ende dieses Zeitraums sollte Menveo Injektionslösung verwendet oder entsorgt werden. Diese Informationen sind nur dazu bestimmt, dem medizinischen Fachpersonal eine Anleitung bei vorübergehenden Temperaturabweichungen zu geben.

### 6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

Lösung in einer Durchstechflasche (Glas Typ I) mit Bromobutyl-Gummistopfen, beschichtet mit Ethylen-Tetrafluorethylen (ETFE), und einer rosafarbenen Verschlusskappe.

Eine Dosis (1 Durchstechflasche) oder 10 Dosen (10 Durchstechflaschen) pro Packung. Jede Durchstechflasche enthält eine Dosis von 0,5 ml.

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

## 6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Beseitigung und sonstige Hinweise zur Handhabung

Der Impfstoff ist eine gebrauchsfertige Injektionslösung.

Der Impfstoff ist vor der Verabreichung visuell zu überprüfen.

Der Impfstoff ist eine farblose, klare, flüssige Lösung, die nahezu frei von sichtbaren Partikeln ist. Falls Fremdpartikel und/oder Veränderungen des physikalischen Aussehens beobachtet werden, darf der Impfstoff nicht verabreicht werden.

Mit Hilfe einer Spritze und einer geeigneten Nadel ist der gesamte Inhalt der Durchstechflasche aufzuziehen.

Vor der Injektion muss die Nadel, die zur Entnahme verwendet wurde, durch eine Nadel, die zur Verabreichung geeignet ist, ausgetauscht werden. Stellen Sie vor der Verabreichung des Impfstoffes sicher, dass sich keine Luftblasen in der Spritze befinden.

Nicht verwendetes Arzneimittel oder Abfallmaterial ist entsprechend den nationalen Anforderungen zu beseitigen.

## 7. INHABER DER ZULASSUNG

GSK Vaccines S.r.l.  
Via Fiorentina 1  
53100 Siena, Italien

## 8. ZULASSUNGNUMMERN

EU/1/10/614/005  
EU/1/10/614/006

## 9. DATUM DER ERTEILUNG DER ZULASSUNG/VERLÄNGERUNG DER ZULASSUNG

Datum der Erteilung der Zulassung:  
15. März 2010  
Datum der letzten Verlängerung der Zulassung: 04. Dezember 2014

## 10. STAND DER INFORMATION

September 2025

Ausführliche Informationen zu diesem Arzneimittel sind auf den Internetseiten der Europäischen Arzneimittel-Agentur <https://www.ema.europa.eu> verfügbar.

## 11. VERKAUFSABGRENZUNG

Verschreibungspflichtig

## 12. KONTAKTADRESSE IN DEUTSCHLAND

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG  
80700 München  
Tel.: 0800 1 22 33 55  
E-Mail: [produkt.info@gsk.com](mailto:produkt.info@gsk.com)

## 13. IN DEUTSCHLAND VERFÜGBARE PACKUNGSGRÖSSEN

EU/1/10/614/005  
Packung mit einer Dosis (1 Durchstechflasche)

A1A\_15D086

Rote Liste Service GmbH

[www.fachinfo.de](http://www.fachinfo.de)

Mainzer Landstraße 55  
60329 Frankfurt

